

1900

Keelson

NOTAS

SOBRE ALGUMAS

COCCIDAS BRAZILEIRAS

POR

T. D. A. Cockerell

(REVISTA DO MUSEU PAULISTA—Vol. IV)



SÃO PAULO

TYPOGRAPHIA DO «DIARIO OFFICIAL»

1900

1900

Notas sobre Coccidas brazileiras

POR

T. D. A. COCKERELL

I Uma lista de algumas Coccidas colligidas pelo Dr. Emil A. Goeldi, no Pará Brazil

(1) *Orthezia praelonga* Douglas. Sobre *Citrus limetta* Risso.

(2) *Lecanium coffeae* Walker. Sobre *Psidium guajava* L.

(3) *Lecaninm nigrum* Nietn. var *depressum* Targioni-Tozetti. Sobre *Hibiscus sabdariffa* L.

(4) *Vinsonia stellifera* Westwood. Sobre *Lucuma caimito* R. S.

(5) *Mytilaspis citricola* Packard. Sobre *Citrus limetta* Risso.

(6) *Aspidiotus articulatus* Morgan. Sobre *Cordyline terminalis*. Kunth.

II Um novo *Eriococcus* (Fam. Coccidae) do Brazil

Eriococcus brasiliensis n. sp.

Saccos da femea de côr de creme, 2 1/2 — 3 mm. de comprimento, perfeitamente da fôrma e textura ordinarias (i e. compactamente feltrados) muitas vezes juntamente aggregados. A femea fervida em soda caustica, não tinge o liquido. Espinhos da derme ordinarios,

21—36 micromm. de comprimento, femur com trochanter 147, tibia 78, tarso com unha 105 micromm. Unha com denticulo minuto justamente antes da ponta.

Digitulos delgados, principalmente os da unha, distinctamente nodosos; digitulos tarsaes 51 micromm. de comprimento. Antennas de 7 articulações, formula 37 (24) 56, variando a 3 (72) (45) 6, a primeira articulação sendo omittida em todo o caso, por causa da difficuldade de medil-a satisfactoriamente. As articulações medem então em micromm.: (2) 27-39, (3) 39-45, (4) 27, (5) 21-27, (6) 15-22, (7) 30.

Hab. Ypiranga, Brazil, sobre ramos de *Baccharis*.

(A. Hempel. N. 314 a; tambem colligido por Dr. H. v. Ihering.)

E' uma pequena especie ordinaria, distinguida pela combinação de caracteres, mas não tem particular proeminente.